



Hygiène des mains

- Entre deux patients
- Entre deux activités
- Après le retrait des gants

Respecter les recommandations en vigueur concernant le lavage des mains et la désinfection des mains, notamment un lavage immédiat en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants.

Mains ni souillées, ni mouillées, ni poudrées :

Friction avec un gel hydro-alcoolique

Mains souillées :

Lavage des mains au savon



Tenue de protection

Porter surblouse, masque et lunettes

lors d'exposition à un risque **de projection de sang** ou de liquide biologique.

Porter la surblouse ou un tablier seul

lors d'un soin contaminant ou exposant à un contact large avec un patient.



SURBLOUSE

MASQUE

LUNETTES



Respect des bonnes pratiques

Lors de toute manipulation d'instruments piquants ou coupants souillés :

- **Ne jamais recapuchonner** les aiguilles,
- **Ne pas désadapter à la main** les aiguilles des seringues ou des systèmes de prélèvements sous vide,
- **Jeter immédiatement** sans manipulation les aiguilles et autres instruments piquants ou coupants dans un **conteneur adapté** (conforme à l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié), situé au plus près du soin, dont l'ouverture est facilement accessible et sans dépasser le niveau maximal de remplissage
- **Manipuler avec précaution le matériel réutilisable** souillé et assurer rapidement le traitement approprié.





Port de gants

En cas de risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses, une peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets.

Lors des soins à risque de piqûre ou de coupure.

Si les mains présentent des lésions.

1 PAIRE

1 GESTE

1 PATIENT



Certaines situations peuvent nécessiter des **précautions complémentaires** : port de 2 paires de gants notamment pour les opérateurs au bloc opératoire, port de sous-gants résistants aux coupures pour les gestes particulièrement à risque notamment en anatomo-pathologie.



Matériel

UTILISER DE PRÉFÉRENCE DU MATÉRIEL À USAGE UNIQUE



Utiliser les **dispositifs médicaux de sécurité** mis à disposition.



Transport

De PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES DU LINGE SOUILLÉ DU MATÉRIEL SOUILLÉ

Utiliser un emballage

Pour renforcer la protection lors du transport des prélèvements biologiques.

Dans tous les cas

Les emballages seront **fermés, étanches, à usage unique**, ou, si réutilisables, nettoyés régulièrement.

Éliminés si nécessaire selon des filières définies

